



ÜBERSICHT

Schäden beim Raps

1. Überwachsene Bestände

Ursache: Übermäßiges Wachstum vor dem Winter, hervorgerufen durch zu wüchsige Sorten, zu frühe Saatzeit, hohe Saatstärke oder ein Überangebot an Stickstoff (N).

Gegenmaßnahmen:

- Auswahl geringwüchsiger Sorten
- Anpassung der Saatzeit und -stärke
- Einsatz von Wachstumsreglern
- Optimierung der Düngung

2. Erhöhte Frostempfindlichkeit

Ursache: Hohe Stickstoffversorgung im Herbst, unzureichende Versorgung mit Kalium (K), Magnesium (Mg) und Spurenelementen sowie überhöhter Herbizideinsatz.

Gegenmaßnahmen:

- Anpassung der Stickstoffdüngung
- Sicherstellung der Versorgung mit Schwefel und anderen Mikronährstoffen
- Vermeidung einer Überdosierung von Herbiziden und deren rechtzeitiger Einsatz

3. Abgerissene Wurzeln

Ursache: Zu schnelle Herbstentwicklung, vorzeitiges Wachstum im Frühjahr oder Wechselfröste, die den Boden gefrieren lassen.

Gegenmaßnahmen:

- Anpassung von Aussaatzeit und Sortenwahl
- Vermeidung überhöhter Stickstoffdüngung
- Sicherstellung einer guten Nährstoffversorgung

4. Abiotische Schäden

Ursache: Abiotische Schäden können durch Spritzschäden nach Frost, starke Sonneneinstrahlung und unzureichende Wasserversorgung verursacht werden.